

AZUMO® MG

FONGICIDE

Composition: 80% Soufre

Formulation: Granulé à disperser dans l'eau (WG)

Homologation N°F06-5-009

Classification toxicologique: C

- ✓ Solubilisation dans l'eau rapide ;
- ✓ Efficacité approuvée ;
- ✓ Sans poussière intempestive ;
- ✓ Excellente tolérance par les plantes.

AZUMO® MG est un fongicide à base de soufre micro-granulé d'origine minérale, utilisé en arboriculture, viticulture et en maraîchères pour combattre les oïdiums.

Sa formulation originale (WG) assure une bonne mouillabilité, une bonne tenue en suspension et permet d'éviter tout inconvénient dû à la poussière lors de l'ouverture des sacs et de la préparation de la bouillie.

MODE D'ACTION :

Le soufre mouillable agit par contact de façon préventive à tous les stades de développement de la culture et sur l'ensemble de la végétation. Son mode d'action est multi-site :

- Blocage de la respiration cellulaire.
- Inhibition de la synthèse des acides nucléiques (germination des spores).
- Inhibition de la formation des protéines (croissance du mycélium).
- Destruction des fructifications.

Grâce à cette action multi-sites, le soufre évite la sélection des souches résistantes d'oïdium.



Marque déposée :

AFEPASA

• AZUFRE Y FERTILIZANTES PALLARES •

Pol. Ind de Constantí, Av. de Europa,
1-7. 43120 Constantí
(Tarragona) ESPAÑA

Importé et Distribué par: **AMAROC S.A.**

152, Bd Abdellah Ben Yacine / 20310 – Casablanca

Tél. : 05.22.24.24.71/72 / Fax : 05.22.24.44.53

Site web: www.amaroc-agro.com

UTILISATIONS :

Viticulture



♦ Oïdium :

AZUMO® MG s'utilise pendant toute la période de risque oïdium. **Dose 500 g/hl**

Appliquer **AZUMO® MG** en traitement préventif dès la sortie des feuilles et de la floraison à la fermeture de la grappe (période de sensibilité maximale à la maladie) en respectant une cadence de 7 à 10 jours maximum entre applications.

AZUMO® MG peut être utilisé en traitement curatif à raison de deux interventions espacées de 5 à 7 jours.



Oïdium sur vigne

♦ Excoriose :

Appliquer deux traitements aux stades

- Débourrement : 50% d'éclatement des bourgeons.
- Stade 1 à 3 feuilles étalées.

En fonction des conditions climatiques, 4 à 8 jours peuvent séparer ces deux traitements.




Excoriose sur vigne

Arboriculture Fruitière



♦ Oïdium :

Appliquer **AZUMO® MG** dès le début de la période à risque, à la dose de 500 g/hl. Eviter le soufre durant les quelques jours de pleine floraison pour ne pas perturber les insectes pollinisateurs notamment dans les parcelles « alternantes ». Eviter le mélange Captane + Soufre sur variétés autres que Golden (notamment BRAEBURN, GALA).



Pommier

Pêcher

Cultures maraichères (tomate, poivron et carotte ...)




Dose 500 g /hl

Premier traitement contre l'oïdium dès un risque de dégât et répéter tous les 7 jours.

Délai d'attente 3 jours.

AZUMO® MG permet également de lutter contre l'acariose de la tomate.



Tomate

Carotte

Poivron

Cucurbitacées :



Traiter dès les premiers symptômes.

SELECTIVITE :

Ne pas appliquer **AZUMO® MG** sur les variétés présentant une sensibilité avérée aux produits soufrés. En cas de doute, veuillez effectuer un test de sélectivité préliminaire sur quelques sujets pour vérifier l'innocuité du produit. Ne pas utiliser **AZUMO® MG** en cas de fortes chaleurs (au-delà de 30 °C) (risque de phytotoxicité).

LES MELANGES :

En cas d'utilisation d'**AZUMO® MG** en mélange, veiller toujours à introduire **AZUMO® MG** en premier dans la cuve. Et d'une façon générale respecter l'ordre habituel d'introduction des préparations : les granulés WG suivis des poudres (WP), des solutions concentrées (SC) puis les émulsions concentrées (EC) qui contiennent les solvants puis les concentrées soluble (SL) .