



Glyphosate haute gamme

**Herbicide foliaire systémique
pour lutter contre les mauvaises
herbes annuelles et vivaces**

Agrumes





HERBICIDE FOLIAIRE SYSTEMIQUE

CLINIC PRO est un herbicide systémique efficace contre la plupart des adventices annuelles, vivaces ou pérennes.

Composition : 360 g/L Glyphosate
Formulation : concentré soluble (SL)

Homologation N° : F09-8-013
Classification toxicologique : C

- **Glyphosate** : «Groupe G » selon l'HRAC : Inhibition de EPSP synthase.

CLINIC PRO pénètre dans les plantes à travers les feuilles et les parties vertes ou bois non aoûtés touchés par l'application. Véhiculé rapidement par la sève (en quelques heures) jusqu'à l'extrémité des racines, **CLINIC PRO** détruit totalement les parties aériennes et souterraines des plantes visées.

Les premiers symptômes apparaissent de 3 à 20 jours après traitement. Sur certaines espèces pérennes dont ligneux et semi ligneux, traitées à l'automne, les premiers symptômes apparaissent au redémarrage de la végétation.

Afin de réduire la possibilité d'apparition d'une résistance, il convient de ne pas appliquer la même matière active ou d'autres matières actives classées G sur la même culture durant la même saison.

USAGE AUTORISÉ

Usage		Doses	Max. Appli.	DAR
Agrumes	Dicotylédones annuelles	3 L/ha	1	28 jours
	Graminées annuelles			

SPECTRE D'ACTION

Annuelles sensibles

Agrostis, amarante, anagalis, folle avoine, brome, capselle, repousse de céréales et de colza, chénopode, dactyle, datura, digitale, diplotaxis, euphorbe, fumeterre, gaillet, lamier, mercuriale, morelle, mouron, panic pâturin, ray grass, renouées, sétaire véronique, vulpin.

Annuelles difficiles, Bisannuelles sensibles

Carotte, Chondrille, crépis, épilobe, érigeron, géranium, laitron, pissenlit, plantain, ray grass (installé), trèfle, vesce, Orobanche.

Espèces Vivaces

Agrostis stolonifère, armoise, avoine à chapelet, chardon, chiendents, épiaire, fougère, genêt, gesse tubéreuse, lierre, liserons, mauve, menthe, luzerne, orties, passage, prêle, renouée amphibie, ronce, rumex, sédum, sorgho.

EPOQUE DU TRAITEMENT

CLINIC PRO s'utilise du printemps à l'automne en tenant compte de :

L'efficacité est favorisée par une température poussante (> à 5°C) et une bonne hygrométrie lors du traitement (en période chaude et sèche intervenir plutôt le matin ou en fin de journée).

Pour la flore annuelle germant dans l'hiver,
(véronique, mouron, pâturin, levée de ray-grass...) : au redémarrage de la végétation à des stades allant de tallage / rosette foliaire à montaison.

Pour la flore annuelle germant au printemps / été,
(morelle, amarante, chénopode, digitale, repousses de cultures...) : lorsque l'ensemble des levées s'est effectué.

Pour la flore bisannuelle,
(pissenlits, carotte, érodium...) : au printemps au début montaison lorsque la couverture foliaire est maximale.

Pour la flore vivace ou pérenne,
(chiendent, liseron, chardon, rumex...) ou pérenne (ronces, potentilles...) : lorsque l'ensemble des parties aériennes est développé. La systémie est renforcée en période automnale de descente de sève.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

- Dans le cas de traitement en culture pérenne, éviter toute projection sur les parties vertes non aoûtées de la culture.
- Traiter par temps calme, sans vent pour éviter tout phénomène de dérive sur les cultures voisines.

Importé et distribué par :  **AMAROC**

AMAROC S.A. 152, Bd Abdellah Ben Yacine - Casablanca 20300

Tél: 05.22.24.24.71/72 - Fax : 05.22.24.44.53

Site web: www.amaroc-agro.com

 **Nufarm**
Grow a better tomorrow.