

in FLOW CMZ



Suspension hautement concentrée en Manganèse + Zinc et Cuivre

Composition:

Cuivre (Cu) : 100 g/L

Manganèse (Mn) : 250 g/L

Zinc (Zn) : 250 g/L



DE SANGOSSE
France



AMAROC
CULTIVONS L'INNOVATION

INTÉRÊTS AGRONOMIQUES

INTÉRÊTS DES ÉLÉMENTS

MANGANÈSE

Important pour la photosynthèse, la production de la chlorophylle et la conversion de l'azote

CUIVRE

Influence sur le rendement et la qualité de la production
Participe à la production de la lignine = plante plus résistante = moins de pourriture noire
Meilleure épiaison : Le cuivre est nécessaire à la production de pollen Impliqué dans la chaîne photosynthétique

ZINC

Impliqué dans la régulation de l'élongation entre-nœuds par son rôle dans la formation de l'auxine
Synthèse des protéines : composant de l'ARN polymérase qui accélère la synthèse des protéines



INTÉRÊTS DU PRODUIT

INO-FLOW CMZ prévient et corrige les déficiences en Manganèse et Cuivre de toutes les cultures par application foliaire.
INO-FLOW CMZ garantit des hauts niveaux de rendement et améliore la qualité des productions. Il apporte le Manganèse et le Cuivre sous une forme liquide concentré et fortement efficace
INO-FLOW CMZ est un produit liquide prêt à l'emploi

INTÉRÊTS DE LA FORMULATION

- Durabilité d'action : solubilité et libération progressive des éléments.
- Apport concentré en élément nutritif : permet d'apporter la quantité nécessaire en une seule fois assurant une dose en éléments nutritifs suffisante pour couvrir les besoins des cultures.
- Utilisation lente des sels par la plante : permet une anticipation/prévention des carences.
- Produit non agressif pour les feuilles : aucun risque de brûlure sur feuilles même à des concentrations élevées.
- Miscibilité élevée et utilisation à faible volume d'eau/ha.
- Associé à des agents mouillants, collants et humectants pour augmenter la qualité de pulvérisation et limiter le lessivage des éléments sur les feuilles.

USAGES

* **CEREALES** - Dose : 0,5 à 1 L/ha dans minimum 100 L d'eau

Stade : 1 application à partir de fin tallage jusqu'à l'apparition de la dernière feuille étalée

* **AGRUMES** - Dose/ha : 1 L - Volume d'eau : 1000 L/ha.

2 applications : juste après floraison et pendant le grossissement des fruits.

* **ARBRES FRUITIERS** (Fruits à pépins, fruits à noyau) « Sauf Abricots »

Dose/ha : 1L/ha - Concentration maximale 1%

Stades : 2 applications nouaison et stade grossissement du fruit

* **VIGNE** - Dose : 0,5 - 1 L/ha - Concentration maximale 1%

Stades : 2 à 4 applications E-E2 (sortie et feuilles étalées), G (grappes séparées), chute des capuchons, I (nouaison)

* **CULTURES MARAICHÈRES*** Autres cultures sensibles aux déficiences en Zinc

Dose/ha : 0,5-1L/ha - Concentration maximale 1%

Stades : 1 à 2 application sur feuillage suffisamment développé à 10 jours d'intervalle



Carence Zn



Carence Mn



Carence Zn Mn



Carence Zinc