

Ennemis	Transplantation	Première fleur	Première fleur - apparition de fruits	Apparition de fruits - Récolte	Fin de récolte
Désinfections du sol (Nématodes)	Nematrap [®] Dose: 150l/ha DD [®] 92 - Dose: 170l/ha				
Mouches blanches		Exirel [™] Dose: 60cc/hl	Teppeki [®] Dose: 160g/ha	ALLERTE 10%EC Dose: 25 cc/hl	Oviphyt - Dose: 1 l/hl STARKLE [®] 20 SG Dose: 500g/ha
Tuta Absoluta			Exirel [™] - Dose: 60cc/hl	MEGACLAIM - Dose: 250g/ha	
Noctuelles			Exirel [™] - Dose: 60cc/hl	Prevathon [®] - Dose: 60 cc/hl	
Acariens			SCELTA [®] - Dose: 100cc/hl	BIFENAMITE 480SC - Dose: 20 cc/hl	ZORO [®] - Dose: 50cc/hl
Pourriture du collet		PREVICUR ENERGY 940 SL - Dose : 2l/ha			
Fonte de semis		PREVICUR ENERGY 940 SL - Dose : 3ml/m ²			
		PREVICUR N - Dose : 55cc/m ²			
Alternariose			CUPROXAT FLOWABLE - Dose: 300 cc/hl		
Mildiou		Orvego - Dose: 0,8 l/ha	TIZCA [®] - Dose: 0,4 l/ha	DIAGONAL [®] - Dose: 50 cc/hl	
Oïdium		Alliage [®] - Dose: 50 g/ hl	AZUMO [®] MG- Dose: 500 g/hl	FLINT [®] - Dose: 25 g/hl	
Pourriture grise			FLINT [®] - Dose: 40 g/hl		
Cladosporiose			FLINT [®] - Dose: 25 g/hl		
Carence		ir [®] N NG Dose: 3-5 l/ha	ir [®] FLOW CaMg Dose: 5-7 l/ha	ir [®] CAL 250 Dose: 3-5 l/ha	
Biostimulant organique			AMINOFERT [®] - Dose: 200 à 400 cc/hl		



Programme de traitement de la tomate